

中間試験のお知らせ:

6月16日(月) 13:30 ~ 15:00

3-448 教室 (ここ)

- **Taylor 展開を巡る諸々**
 - ★ 今日 (6/9) の講義内容まで
 - ★ プリントの8章は除く
- 学生証必携
- 今日配布した「Taylor 展開の例」の表の必要部分は試験時にも配布する

Taylor 展開の問題点

(考えなくてはならないこと):

- 級数が収束するか？
- 収束したら元の関数と一致するか？
- 誤差の理論的評価は？
- 項別微積分 (極限操作の順序交換) を
行なってよいか？

→ “Taylor の定理”

形式的 Taylor 展開

$$\begin{aligned} f(x) &\sim f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \end{aligned}$$

で、右辺の和が収束する時、

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(x)$$

であるか？

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(x)$$



$$f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \longrightarrow 0$$

$$R_N(f; x) := f(x) - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n : \text{剰余項}$$

形式的 Taylor 展開が収束して、
元の関数 $f(x)$ と一致:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$



$$R_N(f; x) \longrightarrow 0$$

→ 剰余項 $R_N(f; x)$ の評価が問題

Taylor の定理

$f: N$ 回微分可能 ($N \geq 1$)

$$R_N(f; x) := f(x) - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

とするととき、

$$0 < \exists \theta < 1 : R_N(f; x) = \frac{f^{(N)}(\theta x)}{N!} x^N$$

系

$\exists C > 0 :$

$$\forall N : 0 < \forall \theta < 1 : |f^{(N)}(\theta x)| < C^N$$

$\implies R_N(f; x) \longrightarrow 0 \quad (N \longrightarrow \infty)$

従って、

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

演習問題:

$f(x) = e^x$ の Taylor 展開の
剰余項 $R_N(f; x)$ について、

- (1) $|R_N(f; 1)| < 10^{-4}$ となる
(なるべく小さい) N を与えよ。
- (2) e の近似値を小数第 3 位まで求めよ。
- (3) 誤差が 10^{-3} 以下であることを保証せよ。

n	$1/n!$		
0	1		
1	1		
2	0.5		
3	0.16666...		
4	0.04166...		
5	0.00833...		
6	0.00138...		丸め誤差 ($\times 5$)
7	0.00019...	\uparrow	各 $< 10^{-4}$
8	0.00002...	\downarrow	打切誤差 $< 10^{-4}$
	...		

n	$1/n!$		
0	1		四捨五入して
1	1		● 各々の誤差を半分に
2	0.5		● 誤差が打ち消し合うように
3	0.1667		
4	0.0417		
5	0.0083		
6	0.0014		丸め誤差 (×5)
7	0.0002	↑	各 $< 0.5 \times 10^{-4}$
8	0.0000	↓	打切誤差 $< 10^{-4}$
	2.7183		誤差 $< 3.5 \times 10^{-4} < 10^{-3}$
	$\doteq 2.718$		

例: 二項展開 (a は任意の実数で可):

$$(1+x)^a \sim \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n$$
$$= 1 + ax + \cdots + \binom{a}{n} x^n + \cdots$$

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n(n-1)\cdots 1}$$

: 二項係数 (**binomial coefficient**)

この展開の収束半径・剰余項の評価は？

例: 二項展開 (a は任意の実数で可):

$$(1+x)^a \sim \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n$$
$$= 1 + ax + \cdots + \binom{a}{n} x^n + \cdots$$

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n(n-1)\cdots 1}$$

: 二項係数 (**binomial coefficient**)

この展開の収束半径・剰余項の評価は？

例: 二項展開 (a は任意の実数で可):

$$(1+x)^a \sim \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n$$

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n(n-1)\cdots 1}$$

収束半径:

$$\left| \frac{\binom{a}{n+1}}{\binom{a}{n}} \right| = \left| \frac{a-n}{n+1} \right| \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

より、収束半径 1 ($|x| < 1$ で絶対収束)

剰余項: $|x| < 1$ に対して、

$$\begin{aligned}R_N(f; x) &= \frac{f^{(N)}(\theta x)}{N!} x^N \\ &= \binom{a}{N} (1 + \theta x)^{a-N} x^N\end{aligned}$$

(特に x が -1 に近いとき) 直接の評価が困難
(実際 $a < 0$ のときは $x \rightarrow -1$ で発散)

→ 項別微積分を使って示そう

剰余項: $|x| < 1$ に対して、

$$\begin{aligned}R_N(f; x) &= \frac{f^{(N)}(\theta x)}{N!} x^N \\ &= \binom{a}{N} (1 + \theta x)^{a-N} x^N\end{aligned}$$

(特に x が -1 に近いとき) 直接の評価が困難
(実際 $a < 0$ のときは $x \rightarrow -1$ で発散)

→ 項別微積分を使って示そう

剰余項: $|x| < 1$ に対して、

$$\begin{aligned}R_N(f; x) &= \frac{f^{(N)}(\theta x)}{N!} x^N \\ &= \binom{a}{N} (1 + \theta x)^{a-N} x^N\end{aligned}$$

(特に x が -1 に近いとき) 直接の評価が困難
(実際 $a < 0$ のときは $x \rightarrow -1$ で発散)

→ 項別微積分を使って示そう

Taylor 展開の問題点

(考えなくてはならないこと):

- 級数が収束するか？
- 収束したら元の関数と一致するか？
- 誤差の理論的評価は？
- 項別微積分 (極限操作の順序交換) を
行なってよいか？

Taylor 展開の問題点

(考えなくてはならないこと):

- 級数が収束するか？
- 収束したら元の関数と一致するか？
- 誤差の理論的評価は？
- 項別微積分 (極限操作の順序交換) を
行なってよいか？

項別微積分 (極限操作の順序交換)

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (|x| < r) \text{ のとき}$$

$$\int_{t=0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

(特に右辺は $|x| < r$ で絶対収束)

$$\begin{array}{ccc}
 (a_n x^n)_{n=0}^{\infty} & \xrightarrow{\text{項別微分}} & (n a_n x^{n-1})_{n=1}^{\infty} \\
 \downarrow \text{有限和} & & \downarrow \text{有限和} \\
 \left(\sum_{n=0}^N a_n x^n \right)_{N=0}^{\infty} & \xrightarrow[\text{=微分}]{\text{項別微分}} & \left(\sum_{n=1}^N n a_n x^{n-1} \right)_{N=1}^{\infty} \\
 \downarrow N \rightarrow \infty & & \downarrow N \rightarrow \infty \\
 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n & \xrightarrow{\text{微分}} & \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \stackrel{?}{=} \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}
 \end{array}$$

極限操作が非可換な例:

$$\begin{array}{ccc} \left(\frac{x^2}{1+x^2} \right)^N & \xrightarrow{N \rightarrow \infty} & 0 \\ \downarrow x \rightarrow +\infty & & \downarrow x \rightarrow +\infty \\ 1 & \xrightarrow{N \rightarrow \infty} & ? \end{array}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{1+x^2} \right)^N \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{1+x^2} \right)^N$$

中間試験のお知らせ:

6月16日(月) 13:30 ~ 15:00

3-448 教室 (ここ)

- **Taylor 展開を巡る諸々**
 - ★ 今日 (6/9) の講義内容まで
 - ★ プリントの8章は除く
- 学生証必携
- 今日配布した「Taylor 展開の例」の表の必要部分は試験時にも配布する