

2011 年度春期

# 数学B(微分積分)

(物質生命理工学科1クラス)

↑ クラス分けに注意

(担当: 角皆)

# 理工学の大学初年級で学ぶ数学

数学の分野 (手法)	解析学 (無限小解析)	代数学
理工学の 大学初年級 では	微分積分	線型代数
本学 理工学部 1年次 では	数学 B(微分積分)  微分方程式の基礎 ベクトル解析の基礎	数学 A (線型代数)
標語的には	不等式の数学	等式の数学

## 本講義の概要

- 不等式による評価
- 級数和の収束発散や簡単な場合の判定法
- 平均値の定理から Taylor の定理に至る話
- 逆三角関数など幾つかの新しい関数
- 積分の基礎付けや計算方法

「不等式」は  
高校まででは殆ど扱わない

不等式なんて高校でやったよ!!

## 高校で扱った不等式

例: 2 次不等式

$$x^2 - 7x + 10 < 0$$

を解け。

解答:

$$x^2 - 7x + 10 < 0$$

$$(x - 2)(x - 5) < 0$$

従って、

$$2 < x < 5 \quad \square$$

例: 2 次方程式

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

を解け。

解答:

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$(x - 2)(x - 5) = 0$$

従って、

$$x = 2, 5 \quad \square$$

「不等式」と言っても、  
動作は等式の扱いと同様であった

では、ここで言う

## 「不等式の数学」

とはどういうものか？

## 不等式の数学とは

収束・発散・極限などなど、

それも

- はさみ打ちの原理
- 区分求積法
- 誤差の評価 (**estimate**)

など

## 不等式の数学とは

と言っても難しいことではない

使うことはこの程度

- 推移律 :  $x \leq y, y \leq z \implies x \leq z$
- 演算との関係 :
  - ★  $x \leq y \implies x + a \leq y + a$
  - ★  $a > 0, x \leq y \implies ax \leq ay$
- 三角不等式 :  $|x + y| \leq |x| + |y|$



## 三角不等式の使い方

例題:

分銅  $X$  はほぼ  $3 \text{ g}$  で誤差  $0.01 \text{ g}$  以内、

分銅  $Y$  はほぼ  $5 \text{ g}$  で誤差  $0.02 \text{ g}$  以内、

であるとする。

両方合わせるとほぼ何  $\text{g}$  で誤差はどれくらいか？

## 三角不等式の使い方

分銅  $X$  が  $x$  g、分銅  $Y$  が  $y$  g であるとする。

$$|x - 3| \leq 0.01, \quad |y - 5| \leq 0.02$$

ほぼ  $3 + 5 = 8$  g であるのは良からう。

誤差は、 $|(x + y) - (3 + 5)|$  g である。

これはいくら以内か？ (上からの評価)

## 三角不等式の使い方

$$\begin{aligned} |(x + y) - (3 + 5)| &= |(x - 3) + (y - 5)| \\ &\leq |x - 3| + |y - 5| \\ &\leq 0.01 + 0.02 \\ &= 0.03. \end{aligned}$$

従って、誤差は 0.03 g 以内。

問 1 :

縦が大体 3cm、横が大体 5cm の長方形の紙がある。

従って、面積は大体

$$3 \times 5 = 15\text{cm}^2$$

である。さて、

面積の誤差が  $0.1\text{cm}^2$  以内

であることを保証するためには、

縦横の長さの誤差をどの程度に収めれば良いか？

真の縦の長さを  $x$  cm、

真の横の長さを  $y$  cm としよう。

この時、面積の誤差は  $|xy - 15|$  cm<sup>2</sup> と表せる。

$x = 3 + h$ ,  $y = 5 + k$  とおくと、

$h, k$  がそれぞれ縦横の誤差である。

誤差が  $\delta$  cm 以内とすると、

$$0 \leq |h| \leq \delta, \quad 0 \leq |k| \leq \delta.$$

設定 :

$$\begin{cases} x = 3 + h, & 0 \leq |h| \leq \delta \\ y = 5 + k, & 0 \leq |k| \leq \delta \end{cases}$$

目標 :

$$|h| \leq \delta, |k| \leq \delta \implies |xy - 15| \leq 0.1$$

となる  $\delta$  を見付けること

目標 :  $|h| \leq \delta, |k| \leq \delta \implies |xy - 15| \leq 0.1$

となる  $\delta$  を見付けること

- $\delta$  は 1 つ見付ければ良い
- 余り小さ過ぎない方が良い
- 余りぎりぎりでも良い  
→ 桁くらい判れば良いだろう
- 論理的には厳密であること ( $\equiv$  ではなくて)
- 誤差の限界 (今は 0.1) が小さくなくても  
通用する方法が良い

$$0 \leq |h| \leq \delta, \quad 0 \leq |k| \leq \delta$$

---

$$\begin{aligned} |(3+h)(5+k) - 15| &= |5h + 3k + hk| \\ &\leq 5|h| + 3|k| + |h||k| \\ &\leq 5\delta + 3\delta + \delta^2 \\ &= 8\delta + \delta^2. \end{aligned}$$

従って、

$$8\delta + \delta^2 \leq 0.1$$

となれば良い



## 2次不等式

$$8\delta + \delta^2 \leq 0.1$$

を解くのは大変だ

しかし、

- 誤差の限界  $\delta$  が大きい時は興味がない
- ぎりぎりを狙う必要はない

→ **例えば**  $\delta \leq 1$  という条件付きで考えれば良い

そこで、

$$\delta \leq 1$$

とする。すると、

$$\begin{aligned} 8\delta + \delta^2 &\leq 8\delta + \delta \\ &= 9\delta \\ &< 10\delta \end{aligned}$$

であるから、

$$10\delta \leq 0.1$$

となれば良い。

これより、

$$\delta \leq \frac{1}{100} = 0.01$$

となる。これと、さっき仮定した

$$\delta \leq 1$$

とを共に満たせば良いので、

$$\delta = \min\{1, 0.01\} = 0.01$$

に取れる。従って、縦横の長さの誤差は  
0.01cm 以内

であれば良い。

さっき  $\delta \leq 1$  とした後に、

$$8\delta + \delta^2 \leq 8\delta + 1$$

とすることも出来た  
(ここだけ見るなら論理的には正しい)

しかし、これだと

$$8\delta + 1 \leq 0.1$$

としなければならなくなってしまい困る

→ 目標を見定めて議論を進める必要性

(技術的な細かい話)

もう少し厳しく、

$$\delta \leq \frac{1}{10} = 0.1$$

としておけば、

$$8\delta + \delta^2 \leq 8\delta + \frac{1}{100}$$

なので、

$$8\delta + \frac{1}{100} \leq 0.1$$

であれば良い

このような  $\delta$  なら取ることが出来る

(技術的な細かい話)

しかし、この論法のためには、

0.1 だったらどれくらいにすれば良いか、  
かなり注意深く取っておかないと破綻する  
(本末転倒)

さっきのように、 $\delta \leq 1$  の下で、

$$\delta^2 \leq \delta$$

で評価しておけば、

誤差の限界が小さくなっても、

後で  $\delta$  を小さくとれば対応できる

## (技術的な細かい話)

勿論、より精密な限界が知りたければ / 必要ならば、

- 2次不等式  $8\delta + \delta^2 \leq 1$  を解くなり、
- もっと精密な評価をするなり、

すればよい / せねばならない

今までは、  
誤差の限界が  $0.1\text{cm}^2$  に設定されていて、  
その値以内に収めようとしてきたが、

この場合、原理的には、  
どんなに厳しい(小さい)限界に対しても、  
同様の議論が可能

→ 誤差の限界が  $0.001\text{cm}^2$  だったら？

→ より一般に、誤差の限界を  $\varepsilon\text{cm}^2$  とすると？



問 1+ :

縦が大体 3cm、横が大体 5cm の長方形の紙がある。

従って、面積は大体

$$3 \times 5 = 15\text{cm}^2$$

である。さて、正の実数値  $\varepsilon > 0$  に対し、

面積の誤差が  $\varepsilon \text{ cm}^2$  以内

であることを保証するためには、

縦横の長さの誤差をどの程度に収めれば良いか？

任意の (どんなに小さい)

正の実数値  $\varepsilon > 0$  に対しても、

$$|h| \leq \delta, |k| \leq \delta \implies |(3+h)(5+k) - 15| \leq \varepsilon$$

となる正の実数値  $\delta > 0$  を見付けることが  
可能であった

( $\varepsilon$  が小さければ  $\delta$  も小さくしなければ  
いけないけれども)

これはどういうことかと言うと、

「 $h, k$  が充分  $0$  に近ければ、

$(3 + h)(5 + k)$  は充分  $3 \cdot 5 = 15$  に近い」

ということを言っている

これが

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} (3 + h)(5 + k) = 15$$

或は

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow 5}} xy = 15$$

の実質的な意味内容なのであった !!